

# **Дослідження реанімації новонароджених в Іспанії: розбіжність між настановами та практикою**

## **Резюме**

Мета: проаналізувати знання та застосування міжнародно рекомендованих настанов з реанімації новонароджених (РН) серед працівників пологових залів іспанських лікарень.

Методи: дослідження було організовано у вигляді опитування, що стосувалося обладнання для РН та практик, що застосовуються в лікарнях іспанської національної системи охорони здоров'я, класифікованих відповідно до рівня надання допомоги.

## Результати

Було заповнено 88% опитників. Межі проведення дослідження склали 23-24 тижня в 78% лікарень. Наявність сертифікованої ради та інструкторів з питань РН була значно вища на III рівні надання допомоги порівняно із закладами I-II рівнів (94 проти 70% та 78 проти 51% відповідно). Не було знайдено різниці між закладами щодо обладнання або знання настанов з реанімації. Суттєва різниця була знайдена в процедурах застосуванні кисню та подальшому спостереженню за його рівнем, а також вентиляції з позитивним тиском під час реанімації та транспортуванні.

## Висновки

Наявність обладнання та знання настанов з РН не відрізняється по закладах різного рівня надання допомоги. Однак ефективність реанімації та транспортування у закладах III рівня значно більше відповідає міжнародно рекомендованим настановам з РН.